

## **Terapija uz B17 ("HUNZA" ekstrakt sjemenki kajsije)**

Kod preventivnog uzimanja kapsula "**Hunza**" (Amigdalina/Laetrila/B17) od 400 mg efekat se pojačava ako se uzima i 5 do 7 sjemenki iz košćica kajsija na 10 kg težine, 5 do 6 puta tijekom dana (upitno je da li i više od toga smeta) jer, u košticama se nalaze i drugi vitamini, minerali i enzimi, koji će se aktivirati i pomoći "Laetrilu" da se u tijelu asimilira.

Za zaštitu (preventivu) od malignih poremećaja, dovoljno je uzeti 1-2 kapsule vitamina B-17 ili pedesetak sjemenki kajsije (marelice).

Ukoliko su počele maligne promjene, tada treba uzeti 3 - 5 kapsula na dan uz enzime Tripsin i Kimotripsin koji služe za probijanje tumorske ovojnice (u Srbiji u apoteci potražiti **CHYMORAL**) i uzimati prema priloženom uputstvu.

### **CINK**

je obavezan kao "transporter" B17 po organizmu i to u količinama od 30 do 50 mg dnevno, te VITAMIN C u obliku

### **NATRIJ**

(Sodium)

### **ASKORBATA**

, odnosno, njegovom

### **LIPOSOMALNOM**

obliku. Možete ga nabaviti na istim telefonima kao i B17 a možete ga napraviti i sami od askorbinske kiseline, sode bikarbone i vode. Još jedan dodatak prehrani je neophodan i trebalo bi ga uzimati još prije B17: čudotvorni mineral -

### **MAGNEZIJ KLORID**

. O njemu i njegovom djelovanju na kancer ima ovdje poseban članak.

Ovo je minimalni paket u terapiji sa **B17**, a onaj djelotvorniji treba još sadržavati: **Vitamin A (BETA CAROTEN), VITAMIN E**

i grupu vitamina

**B**

koji sadrže

**B1, B3 i B6**

, i mogu se nabaviti pod nazivom

**B 100**

ili

**B 50**

. Valjalo bi nabaviti i

**vitamin B15 – Pangamičnu kiselinu**

.

**Kod problema sa zgrušavanjem krvi, vitamin E I ENZIME uzimati pod kontrolom liječnika**

Još jedna preporuka za čaj - pijte **čaj od LISTA MALINE** umjesto zelenog čaja jer, ne samo da je jači antioksidans već se malina uzgaja na našem području i po tome nam odgovara mnogo više od bilo kakvog (indijskog, cejlonskog ...) čaja.

Sama terapija podrazumijeva, po preporukama dr Binzela, isključivo hranu biljnog porijekla i to termički neobrađenu – sirovu (prijesnu). Samo hrana biljnog porijekla ne troši enzime (prijeko potrebne za probijanje tumorske ovojnice) i samo sirova (prijesna) hrana sadrži baš te prijeko potrebne enzime.

Najvažniji element dijete su sokovi od sirovog **POVRĆA** (ne voća).

Sok se pravi od sveg povrća koje Vam je dostupno, na primjer: **mrkva, cikla, brokoli, crni (crveni) luk, kelj, kupus, karfiol (cvjetača) itd**

.

Jako dobro je koristiti i **bilje iz prirode** (malo dalje od prometnica), prije svega **koprivu, sremuš, bokvicu (trputac), maslačak**

– posebno u rano proljeće dok nije još neprijatno gorak,

**korijen čička itd**

.

**Kod svih pomenutih biljnih vrsta mogu se koristiti svi njihovi dijelovi (Korijen, list, stabljika, cvijet, plod, sjeme)**

Sokovi od svježeg povrća proizvode žive enzime koji se lako apsorbiraju i dolaze na stanični nivo u roku od 15 minuta čime se potiče rast i razvoj zdravih stanica. Enzimi iz povrća uništavaju se već na temperaturi od 40 stupnjeva Celzija, zato je potrebno da se povrće unosi u sirovom (prijesnom) stanju.

**Izbegavajte, da ne pišem da su zabranjeni, čokolada, čajevi ( osim biljnih ), crna kava i svi ugljeni hidrati, odnosno, prosti (brzi) šećeri. Ovo isključuje i MED iz prehrane i sve slatko voće, posebno banane, narandže, mandarine, breskve, kajsije i sve ostalo slatko voće jer pored fruktoze, sadrži i puno glukoze.**

Od voća, preporučuje se **bobičasto**, poput **borovnice, aronije, ribizle, ogrozda, maline i sl.**

**Naime, utvrđeno je da se tumori hrane FERMENTIMA ili fermentacijom ŠEĆERA, zato je, pored unosa šećera, zabranjen i unos alkohola, sirceta, zrelih sireva i svega ostalog što je dobijeno fermentacijom.**

Jedini izuzetak je **mladi, nemasni sir, a još bolja je skuta, odnosno, u Srbiji poznata kao urda** - sir dobijen drugom fermentacijom surutke i to obavezno u kombinaciji sa **LANENIM ULJEM.**

Slijedeće na što treba obratiti pažnju su **MASNOĆE**. Nikako ne uzimati rafinisane masnoće što, pored redovnih ulja u trgovinama, podrazumijeva i margarine. Preporučuju se isključivo **HLADNO CIJEĐENA ULJA**

, od kojih je najdjelotvornije laneno jer se sastoji od 18 članaka masnih nezasićenih kiselina. Dobro je i maslinovo ali u njega treba dodati malo lanenog kako bi se lanac od 2 x 9 masnih nezasićenih kiselina u maslinovom ulju povezao u neprekidnih 18.

Jednako tako, preporuka je da se u potpunosti iz ishrane izbacimo meso i mesni proizvodi, kao i mlijeko i mliječni proizvodi, osim već pominjanog mladog sira u kombinaciji s lanenim uljem. Čovjek nije rođen kao mesožder, što se vidi po načinu na koji može pokretati vilicu (naprijed - nazad i lijevo - desno) dok mesožderi to mogu samo gore - dolje. A što se tiče mlijeka i mliječnih proizvoda, ni jedan sisar na planeti ne jede mlijeko posle perioda dojenja, pa ne treba ni čovjek. Posebno, što se poslije 3 godine starosti, iz organizma gubi enzim laktaza koji služi za probavu laktoze iz mlijeka i mlijeko za čovjeka postaje neprobavljivo.

**SVAKI DAN obavezno popiti 0,5 - 1 l. soka od povrća (mrkve, peršuna i ostalog, gore pomenutog)**

Ovo je najbolji način da se u organizam unese organski kalcijum koji ulazi u kosti i u zube, za razliku od mliječnih proizvoda, koji kalcijum izvlače iz kostiju i uzrokuju njegovo prebacivanje u meka tkiva (o tome piše u posebnoj brošuri o Magnezijum kloridu).

**Uzeto iz Liječničkog priručnika za terapiju sa B17**

Krebs pretpostavlja da je tokom vremena ukupna doza od 300 grama dnevno, prosjek u kontroli umjerenog kancera. Vrijeme potrebno, da bi se dobili maksimalni rezultati, je od 12 do 24 mjeseca. Ako se dobri rezultati postignu u toku prva tri tjedna, doza može biti smanjena ili klinički raspored promijenjen kako bi odgovarao pacijentu.

**Jako kancerogeno oboljenje, dovedeno pod kontrolu, može biti držano u stanju mirovanja oralnim davanjem 1 grama vitamina B17 dnevno. Bilo kako, neki pacijenti tvrde da se osjećaju „bolje” ili „sigurnije” sa dozom od 1.5 do 2 grama, 13 do 17 puta dnevno. Takva doza se utvrđuje pacijentovim osećanjem dobrobiti, povećanja snage, poboljšanja apetita, dobitka na težini i psihološkog poboljšanja, sa smanjenjem zabrinutosti i nervoze i pokazivanjem skoro normalnog nivoa optimizma i interesovanja za okolinu.**

Poznato je da abnormalne situacije, stres ili narušeno zdravlje, mogu biti praćene ponovnim rastom i napredovanjem kancera kod nekih pacijenata. Liječnik mora biti svjestan tih mogućnosti kod pacijenata kod kojih je kancer pod kontrolom. Kada je kancer uspješno kontroliran više od dvije godine, a pacijent pokazuje dobre objektivne rezultate u dobijanju na težini, povećanju snage, povratku skoro normalnoj živosti i vitalnosti, sa negativnim HCG testom urina, i sa poboljšanjem vidljivim na rentgenskim snimcima i drugim objektivnim dokazima, doza za održavanje može biti svedena na minimalnih 500 mg vitamina B17 dnevno.

**Ne postoje kontraindikacije za upotrebu vitamina B17 i/ili proteolitičkih enzima zajedno sa kirurgijom, radijacijom i cito toksinima.**